


## INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSFERT EMBRYONNAIRE

### • Vous avez rendez-vous pour un transfert embryonnaire (embryon frais ou embryon congelé)

- La date du transfert est fixée par le médecin en fonction de votre cycle et du stade de développement des embryons.
- Conformément au « Guide des bonnes pratiques » il est obligatoire que votre conjoint soit présent avec vous le jour du transfert embryonnaire.
- Venez chacun avec une pièce d'identité (carte d'identité-Passeport-titre de séjour) Le permis de conduire n'est pas accepté comme pièce d'identité!!.
- Le transfert embryonnaire est un acte simple et indolore qui ne nécessite aucune anesthésie. Il est réalisé dans la salle d'examen du centre d'AMP sous contrôle échographique.
- Votre vessie doit être semi-pleine mais vous ne devez pas être gênée par. L'envie d'uriner le jour du transfert il faut prendre votre traitement normalement et mettre les ovules de progestérone par voie vaginale le matin.



### • APRÈS LE TRANSFERT EMBRYONNAIRE

- Le repos strict n'est pas recommandé, il faut reprendre une activité normale après le transfert.
- Le transfert embryonnaire ne donne pas lieu à un arrêt de travail et rentre dans le parcours de la «Loi santé».
- Les rapports sexuels sont possibles après un transfert embryonnaire même si l'on recommande une brève abstinence de 24 heures.
- Il est recommandé de ne pas consommer d'alcool jusqu'au test de grossesse et de faire attention à votre alimentation si vous n'êtes pas immunisée contre la toxoplasmose .
- Le test de grossesse sanguin doit être réalisé dans le laboratoire de votre choix 15 jours après l'ovulation ou après l'introduction de la progestérone en cas de traitement artificiel.



Centre d'AMP HPV  
Tel : 01 84 23 87 45 - 01 46 77 12 14  
fiori.pma@gmail.com

- Si le résultat de votre dosage est **positif (> 5 UI/ml)** il faut :
  - Continuer le traitement d'ovules de progestérone et d'acide folique.
  - Contrôler le dosage dans le même laboratoire 48h après le premier dosage puis une semaine après.
  - Prendre RDV 5 semaines après la première prise de sang pour une échographie de datation de grossesse avec le Dr Fiori sur Doctolib.

**Dr Fiori sur Doctolib**  
Prendre rendez-vous

Doctolib



- Si le résultat de votre dosage est **négatif (< 5 UI/ml)** il faut :
  - Arrêter les ovules de progestérone.
  - Continuer l'acide folique.
  - Reprendre un RDV de vidéo consultation pour organiser la suite de votre parcours.